



Cognome: VERSIONE ..... Nome: PRELIMINARE .....

Solo durante le prime due ore è consentita la consultazione di un libro di testo di teoria. È sempre vietata la consultazione di ogni altro materiale (strumenti elettronici, fotocopie, appunti, dispense, libri di esercizi, ecc.). Per ottenere la sufficienza occorre SIA risolvere correttamente e completamente almeno due esercizi, SIA ottenere almeno 18 punti. È possibile ritirarsi in qualunque momento. Le risposte devono essere motivate. Il punteggio indicativo si riferisce a risposte e svolgimenti corretti e completi. Consultare il docente SOLO in caso di dubbi sul testo. Questo documento è composto da 5 fogli e contiene 4 esercizi e lo spazio per rispondere alle domande che saranno consegnate dopo due ore.

(1) Sia  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la funzione definita da

$$f(x, y) = x^4 - x^2y^2 + 2y^4.$$

- Determinare gli eventuali punti critici di  $f$ ;
- stabilire la natura degli eventuali punti critici di  $f$ ;
- trovare massimo e minimo assoluti di  $f$  in  $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ .

punti: 6

Risposta: a)  $(0, 0)$ ; b) punto di minimo;

c)  $\max_K f = 2$ ,  $\min_K f = 0$ .

Svolgimento:

$$a) \begin{cases} f_x = 4x^3 - 2xy^2 = 2x(2x^2 - y^2) = 0 \\ f_y = -2x^2y + 8y^3 = 2y(4y^2 - x^2) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ 8y^3=0 \end{cases} \text{ oppure } \begin{cases} 4x^3=0 \\ y=0 \end{cases} \text{ oppure } \begin{cases} 7y^2=0 \\ 4y^2=x^2 \end{cases}$$

Quindi l'unico punto critico è  $(0, 0)$ .

b) Un semplice calcolo mostra che  $D^2f(0, 0) = 0$ .

Tuttavia, si ha

$$f(x, y) \geq f(0, 0) = 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad (*)$$

quindi  $(0, 0)$  è un punto di minimo (assoluto).

Ci sono almeno tre modi per verificare (\*):

1) utilizzando la disuguaglianza di C.S.,

$$x^2 y^2 \leq \frac{1}{2} x^4 + \frac{1}{2} y^4 \Rightarrow x^4 - x^2 y^2 + 2y^4 \geq \frac{1}{2} x^4 + \frac{3}{2} y^4 > 0;$$

2) osservando che, per  $y \neq 0$ ,

$$f(x, y) > 0 \Leftrightarrow z^2 - z + 2 \geq 0, \quad z = x^2/y^2,$$

che è vera perché  $\Delta < 0$ , mentre, per  $y = 0$ ,  $f(x, 0) = x^4 \geq 0$ .

3) osservando che

$$f(x, y) = (x^2 - y^2/2)^2 + 7/4 y^4 \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

perché somma di quadrati.

c) Candidati punti di estremo su  $\partial K$ :

$$L(x, y, \lambda) = x^4 - x^2 y^2 + 2y^4 - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

$$\nabla L(x, y, \lambda) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 2xy^2 - 2\lambda x = 2x(2x^2 - y^2 - \lambda) = 0 \\ -2x^2 y + 8y^3 - 2\lambda y = 2y(4y^2 - x^2 - \lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y^2 = 1 \end{cases} \text{ oppure } \begin{cases} y = 0 \\ x^2 = 1 \end{cases} \text{ oppure } \begin{cases} \lambda = 2x^2 - y^2 = 4y^2 - x^2 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Ⓘ

Ⓜ

In corrispondenza si hanno i seguenti valori di  $f$ :

$$f(\text{I}) = 2$$

$$f(\text{II}) = 1$$

$$f(\text{III}) = \frac{25}{64} - \frac{15}{64} + 2 \cdot \frac{9}{64} = \frac{28}{64} < 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5y^2 = 3x^2 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = 3/8 \\ x^2 = 5/8 \end{cases} \quad \text{ⓂⓂ}$$

Aggiungendo  $f(0, 0) = 0$  (punto critico interno)

si ottiene la risposta.

(2) Sia

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq y \leq x \leq 2\sqrt{1-y^2-z^2} \right\}.$$

Calcolare

$$\iiint_{\Omega} x \, dx dy dz.$$

punti: 6

Risposta:

$$\frac{2\pi}{\sqrt{5}}$$

Svolgimento:

Per fili:  $y \leq 2\sqrt{1-y^2-z^2}$   $\stackrel{y \geq 0}{\Leftrightarrow} y^2 \leq 4(1-y^2-z^2)$   
 $\Leftrightarrow 5y^2 + 4z^2 \leq 4$

Quindi

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in D, \quad y \leq x \leq 2\sqrt{1-y^2-z^2} \right\}$$

con

$$D = \left\{ (y, z) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0, \quad 5y^2 + 4z^2 \leq 4 \right\}$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x \, dx &= \iint_D \left( \int_y^{2\sqrt{1-y^2-z^2}} x \, dx \right) dy dz \\ &= \frac{1}{2} \iint_D [4(1-y^2-z^2) - y^2] dy dz \\ &= \frac{1}{2} \iint_D (4 - 5y^2 - 4z^2) dy dz \end{aligned}$$

Passando in coordinate ellittiche,

$$\begin{cases} y = \frac{2}{\sqrt{5}} \rho \cos \varphi \\ z = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

si ottiene  $5y^2 + 4z^2 = 4\rho^2 \cos^2 \varphi + 4\rho^2 \sin^2 \varphi = 4\rho^2 \leq 4$   
 $\Leftrightarrow \rho \leq 1$

e  $y \geq 0 \Leftrightarrow \varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$ .

Quindi

$$\iiint_{\Omega} x \, d\underline{x} = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^1 4(1-\rho^2) \cdot \overbrace{\frac{2}{\sqrt{5}} \rho}^{\text{determ. Jacobiano}}$$

$$= \frac{4\pi}{\sqrt{5}} \left[ \frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{\sqrt{5}}$$

(3) Sia  $\gamma^+ : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$  la curva definita da  $\gamma(t) = (\sin^2(t), \sin(t) \cos(t))$ ,  $t \in [0, \pi]$ , e orientata nel verso delle  $t$  crescenti.

- Verificare che  $\gamma$  è semplice e chiusa e/o disegnarla;
- calcolarne la lunghezza;
- calcolare l'area del dominio limitato  $\Omega$  delimitato da  $\gamma$ ;
- determinare il valore di  $\alpha \in \mathbb{R}$  per il quale il lavoro del campo vettoriale

$$V(x, y) = \left( \frac{y}{1+x}, \log(1+x) + \alpha\sqrt{x} \right)$$

lungo  $\gamma^+$  sia uguale a  $-2$ .

punti: 6

Risposta: b)  $\pi$ ; c)  $\pi/2$ ; d)  $\alpha = 1/3$ .

Svolgimento:

a) Chiusa:  $\gamma(0) = \gamma(\pi) = (0, 0)$ .

Semplice:  $\gamma(t) = \gamma(s) \Leftrightarrow \begin{cases} \sin^2 t = \sin^2 s \\ \sin t \cos t = \sin s \cos s \end{cases}$

$\Leftrightarrow t = s$  oppure  $\begin{cases} t = \pi - s \\ \sin t \cos t = -\sin s \cos s = \sin s \cos s \end{cases}$

$\Leftrightarrow \sin s \cos s = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} s = 0, \pi \\ s = t (= \pi/2) \end{cases}$

Quindi le uniche possibilità sono  $t = s$  o  $s = 0, \pi$ .


Pertanto la curva è semplice. Il grafico si ottiene osservando che, per  $t \in [0, \pi/2]$ ,

$$\sin t \cos t = \sqrt{\sin^2 t} \sqrt{1 - \sin^2 t}$$

$\downarrow$   
 $\sin t > 0$

$\Leftrightarrow v = \sin^2 t \in [0, 1]$   
 $(v, \sqrt{v(1-v)})$

e poi per simmetria per  $t \in [\pi/2, \pi]$



$$b) |\dot{\gamma}| = \int_0^{\pi} |\dot{\gamma}| dt = \int_0^{\pi} 1 dt = \pi$$

$$\begin{cases} \cos t = c \\ \sin t = s \end{cases}$$

$$\dot{\gamma} = (2sint \cos t, \cos^2 t - \sin^2 t)$$

$$|\dot{\gamma}|^2 = 4s^2c^2 + c^4 - 2c^2s^2 + s^4 = (\cos^2 t + \sin^2 t)^2 = 1$$

$$c) |\Omega| = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi} x dy - y dx = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi} s^2(c^2 - s^2) - sc(2sc) dt$$

orientazione  
di  $\gamma$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^{\pi} -s^4 - s^2c^2 dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin^2 t dt = \frac{\pi}{4}$$

$$d) \underline{V} = \underline{V}_1 + \underline{V}_2 \quad \text{con} \quad \underline{V}_1 = \left( \frac{y}{1+x}, \log(1+x) \right)$$

$$\underline{V}_2 = (0, \alpha \sqrt{x})$$

$\underline{V}_1$  è conservativo in  $x > -1$ , con  $U(x, y) = y \log(1+x)$ .

Quindi

$$L = \int_{\gamma^+} \underline{V}_2 \circ d\underline{x} = \int_{\gamma^+} \alpha \sqrt{x} dy = \int_0^{\pi} \alpha \sin t (\cos^2 t - \sin^2 t) dt$$

$$= \alpha \int_0^{\pi} \sin t (2 \cos^2 t - 1) dt = \alpha \left[ -\frac{2}{3} \cos^3 t + \cos t \right]_0^{\pi}$$

$$= \alpha \left( \frac{2}{3} - 1 + \frac{2}{3} - 1 \right) = -\frac{2}{3} \alpha \stackrel{\nabla}{=} -2$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 1/3$$

(4)

- a) Determinare, se esistono, i valori del parametro  $\alpha \in \mathbb{R}$  per i quali tutte le soluzioni dell'equazione

$$y''(x) + \alpha y'(x) + y(x) = 0$$

verificano  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ .

- b) Per tali valori di  $\alpha$ , determinare l'integrale generale della seguente equazione:

$$y''(x) + \alpha y'(x) + y(x) = e^{-x}.$$

6 punti

Risposta:  $\alpha > 0$

$$\alpha \in (0, 2): y(x) = e^{-\frac{\alpha x}{2}} \left( C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{4-\alpha^2}}{2} x\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{4-\alpha^2}}{2} x\right) \right) + \frac{e^{-x}}{2-\alpha}$$

$$\alpha = 2: y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + \frac{x^2}{2} e^{-x}$$

$$\alpha > 2: y(x) = C_1 e^{-\lambda_1 x} + C_2 e^{-\lambda_2 x} + \frac{1}{2-\alpha} e^{-x} \quad (\text{vedi } \square)$$

Svolgimento:

$$\text{Risolvo l'omogenea: } \lambda^2 + \alpha\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 4}}{2}$$

$$\text{Integrale generale: } y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} \quad \text{se } |\alpha| \neq 2$$

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 x e^{\lambda_1 x} \quad \text{se } |\alpha| = 2$$

$$\text{Si ha } \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{Re} \lambda_1 < 0 \text{ e } \operatorname{Re} \lambda_2 < 0$$

$$|\alpha| \geq 2: \text{ (i) } \lambda_1 = \frac{-\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 4}}{2} < 0 \Leftrightarrow \sqrt{\alpha^2 - 4} < \alpha \Leftrightarrow \alpha > 2$$

$$\text{ (ii) } \lambda_2 = \frac{-\alpha - \sqrt{\alpha^2 - 4}}{2} < 0 \Leftrightarrow -\alpha < \sqrt{\alpha^2 - 4} \Leftrightarrow \alpha > 2$$

$$|\alpha| < 2 \quad \lambda_{1,2} = -\frac{\alpha}{2} \pm i\sqrt{4-\alpha^2}, \quad \operatorname{Re} \lambda_{1,2} < 0 \Leftrightarrow \alpha > 0$$

$$\text{Soluzione particolare: } y_p(x) = A e^{-x}, \quad \alpha \neq 2$$

$$y_p'' + \alpha y_p' + y_p = A e^{-x} (1 - \alpha + 1) \stackrel{!}{=} e^{-x} \Leftrightarrow A = \frac{1}{2-\alpha}$$

Se  $\alpha = 2$ , allora  $y_p(x) = Ax^2e^{-x}$

$$y_p'(x) = Ae^{-x}(2x - x^2)$$

$$y_p''(x) = Ae^{-x}(x^2 - 2\alpha + 2 - 2x)$$

$$y_p'' + 2y_p' + y_p = Ae^{-x}(x^2 - 4x + 2 + 4x - 2x^2 + x^2)$$
$$= 2Ae^{-x} \stackrel{\Delta}{=} e^{-x} \Leftrightarrow A = 1/2.$$



(5) Rispondere alle domande che saranno distribuite durante il compito.

8 punti

Svolgimento:

---

① Enunciare e dimostrare le formule di Green nel piano per un dominio semplice rispetto a entrambi gli assi.

2) Sia  $f : [0, 1] \rightarrow (0, +\infty)$  una funzione di classe  $C^1$  e sia  $\Sigma$  la superficie ottenuta ruotando il grafico di  $f$ ,

$$\text{graf } f = \{(y, z) = (f(z), z), z \in [0, 1]\},$$

di un angolo giro intorno all'asse  $z$ . Fornire e dimostrare la formula per il calcolo della sua area.

---